

საწური

საპასპორტო ინფორმაცია:

წარმოშობის ქვეყანა	საქართველო
ტაქსონომია	<i>Vitis vinifera</i> L. ssp.
სინონიმები	
ნომერი კოლექციაში	
მარცვლის ფერი	ლურჯი-მოშავო
გამოყენება	საღვინე - იძლევა მაღალხარისხოვან წითელ ღვინოს
სავეგეტაციო პერიოდი (საშ.დღე)	
ნიმუშის შესაბამისობა აღწერილობასთან	დასტურდება ამპელოგრაფიულად

ძირითადი ამპელოგრაფიული მახასიათებლები

ახალგაზრდა ყლორტი

2	ზრდის კონუსის გახსნილობა	(5) სრულად გახსნილი
4	ზრდის კონუსზე განთხმული შებუსვის ანტოციანური შეფერილობა	(5) საშუალო
3	ზრდის კონუსზე განთხმული შებუსვის სიხშირე	(5) საშუალო

ყლორტი

9	დგომა (ახვევამდე)	(3) ნახევრად სწორმდგომი
10	მუხლთაშორისების შეფერვა ზურგის მხარეს	(2) წითელი და მწვანე
11	მუხლთაშორისების შეფერვა მუცლის მხარეს	(1) მწვანე

ახალგაზრდა ფოთოლი

6	ფოთლის ზედა მხარის შეფერილობა	(4) ღია ბრინჯაოსფერი წითელი
7	ფოთლის ქვედა მხარეს მთავარ მარღვებს შორის განთხმული შებუსვის სიხშირე	(7) ხშირი

ზრდასრული ფოთოლი

18	ფირფიტის ფორმა	(2) სოლისებური
20	ნაკვეთების რაოდენობა	(3) ხუთი
19	ფირფიტის ზედა მხარის ბურთულოვნება	(5) საშუალო
26	კბილების ფორმა	(5) საშუალო, (2) ორივე გვერდი სწორი და (3) ორივე გვერდი ამოზნექილს შორის
23	ყუნწის ამონაკვეთის გახსნილობა. გადაფარვის ხარისხი	(2) ღია
28	ფოთლის ქვედა მხარეს მთავარ ძარღვებს შორის განრთხმული ბუსუსების სიხშირე	(7) ხშირი

რქა

44	ძირითადი ფერი	(1) მოყვითალო-ყავისფერი
----	---------------	-------------------------

რეპროდუქტიული ორგანო

16	ყვავილი	(3) სრულად განვითარებული მტვრიანები და სრულად განვითარებული გინეცეუმი
----	---------	-----------------------------------------------------------------------

მტევანი

32	მტევნის ზომა (ყუნწის გარეშე)	(5) საშუალო
33	სიკუმსე	(7) ხშირი
34	ყუნწის სიგრძე	(3) მოკლე

მარცვალი

36	ფორმა (ფოტოები)	(2) სფერული
37	მარცვლის კანის შეფერილობა	(9) მოლურჯო-მოშავო
40	რბილობის ანტოციანური შეფერილობა	(1) არ არის
41	რბილობის სიმკვრივე	(1) რბილი
42	განსაკუთრებული გემო	(1) არ აქვს
43	წიპწების არსებობა	(3) სრულფასოვანი

დამატებითი მახასიათებლები OIV-ის მიხედვით:

OIV 016	თანმიმდევრული პწკალების რაოდენობა	(1) ორი ან ნაკლები
OIV 070	ფოთლის ფირფიტის ზედა მხარეზე მთავარი ძარღვების ანტოციანური შეფერილობა	(3) პირველ განტოტვამდე
OIV 072	ფოთლის ფირფიტის გოფრირება	(3) სუსტი
OIV 074	ფოთლის ფირფიტის პროფილი განივ ჭრილში	(5) დახვეული
OIV 080	ფოთლის ყუნწის ამონაკვეთის ფუძის ფორმა	(2) { ფრჩხილის ფორმის
OIV 081-1	ფოთლის ყუნწის ამონაკვეთზე კბილების არსებობა	(9) არის
OIV 081-2	ფოთლის ყუნწის ამონაკვეთის ძარღვით შემოსაზღვრულობა	(1) არ არის
OIV 083-2	ფოთლის ზედა ამონაკვეთზე კბილების არსებობა	(9) არის
OIV 086	ფოთლის ქვედა მხარეს მთავარ ძარღვებზე გართხმული ბუსუსების სიხშირე	(1) არ არის ან ძალიან სუსტი
OIV 087	ფოთლის ქვედა მხარეს მთავარ ძარღვებზე სწორმდგომი ბუსუსების სიხშირე	(1) არ არის ან ძალიან სუსტი
OIV 203	მტევნის სიგანე	(3) ვიწრო
OIV 208	მტევნის ფორმა	(2) კონუსური
OIV 209	ფრთების რაოდენობა	(1) ერთი-ორი
OIV 220	მარცვლის სიგრძე	(3) მოკლე
OIV 221	მარცვლის სიგანე	(3) ვიწრო
OIV 351	ყლორტის ზრდის სიძლიერე	(5) საშუალო
OIV 502	ერთი მტევნის წონა	(3) მცირე
OIV 503	ერთი მარცვლის წონა	(3) მცირე
OIV 504	მოსავალი კგ/მ ²	(7) მაღალი